



Einsender:

Patientendaten:

Genotypische Resistenzbestimmung – HIV

Material: 3 ml EDTA-Blut (bei VL ≤ 1500 cop/ml bitte 10 ml EDTA-Blut !)

Patientendaten:

CD4-Zellzahl: _____ Viruslast: _____

Klinische Einstufung:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> therapienaiv | <input type="checkbox"/> compliant |
| <input type="checkbox"/> Therapieversager | <input type="checkbox"/> non-compliant |

Therapiehistorie, kumulativ:

- | | | | |
|---|---|---|---|
| NRTI/NtRTI | NNRTI | PI | Entryinh. |
| <input type="checkbox"/> AZT (Retrovir [®]) | <input type="checkbox"/> EFV (Sustiva [®]) | <input type="checkbox"/> APV/FPV (Agen. [®] ;Telzir [®]) | <input type="checkbox"/> ENF (Fuzeon [®]) |
| <input type="checkbox"/> DDI (Videx [®]) | <input type="checkbox"/> DLV (Rescriptor [®]) | <input type="checkbox"/> IDV (Crixivan [®]) | <input type="checkbox"/> MVC (Celsentri [®]) |
| <input type="checkbox"/> D4T (Zerit [®]) | <input type="checkbox"/> NVP (Viramune [®]) | <input type="checkbox"/> NFV (Viracept [®]) | Integraseinh. |
| <input type="checkbox"/> ABC (Ziagen [®]) | <input type="checkbox"/> ETR (Intelligence [®]) | <input type="checkbox"/> SQV (Invirase [®]) | <input type="checkbox"/> RAL (Isentress [®]) |
| <input type="checkbox"/> 3TC (Epivir [®]) | <input type="checkbox"/> RPV (Edurant [®]) | <input type="checkbox"/> LPV (Kaletra [®]) | <input type="checkbox"/> EVG (Best. Genvoya [®]) |
| <input type="checkbox"/> Tenofovir (DF/AF) | <input type="checkbox"/> DOR (Pifeltro [®]) | <input type="checkbox"/> ATV (Reyataz [®]) | <input type="checkbox"/> DTG (Tivicay [®]) |
| <input type="checkbox"/> FTC (Emtriva [®]) | | <input type="checkbox"/> TPV (Aptivus [®]) | <input type="checkbox"/> BIC (Best. Biktarvy [®]) |
| <input type="checkbox"/> DDC (Hivid [®]) | | <input type="checkbox"/> DRV (Prezista [®]) | |
| <input type="checkbox"/> sonstige: _____ | | <input type="checkbox"/> RTV (Norvir [®]) | |
| | | <input type="checkbox"/> rtv (Norvir [®] , "Booster") | |

Letzte Therapie vor Genotypisierung

- | | | | |
|---|---|---|---|
| NRTI/NtRTI | NNRTI | PI | Entryinh. |
| <input type="checkbox"/> AZT (Retrovir [®]) | <input type="checkbox"/> EFV (Sustiva [®]) | <input type="checkbox"/> APV/FPV (Agen. [®] ;Telzir [®]) | <input type="checkbox"/> ENF (Fuzeon [®]) |
| <input type="checkbox"/> DDI (Videx [®]) | <input type="checkbox"/> DLV (Rescriptor [®]) | <input type="checkbox"/> IDV (Crixivan [®]) | <input type="checkbox"/> MVC (Celsentri [®]) |
| <input type="checkbox"/> D4T (Zerit [®]) | <input type="checkbox"/> NVP (Viramune [®]) | <input type="checkbox"/> NFV (Viracept [®]) | Integraseinh. |
| <input type="checkbox"/> ABC (Ziagen [®]) | <input type="checkbox"/> ETR (Intelligence [®]) | <input type="checkbox"/> SQV (Invirase [®]) | <input type="checkbox"/> RAL (Isentress [®]) |
| <input type="checkbox"/> 3TC (Epivir [®]) | <input type="checkbox"/> RPV (Edurant [®]) | <input type="checkbox"/> LPV (Kaletra [®]) | <input type="checkbox"/> EVG (Best. Genvoya [®]) |
| <input type="checkbox"/> Tenofovir (DF/AF) | <input type="checkbox"/> DOR (Pifeltro [®]) | <input type="checkbox"/> ATV (Reyataz [®]) | <input type="checkbox"/> DTG (Tivicay [®]) |
| <input type="checkbox"/> FTC (Emtriva [®]) | | <input type="checkbox"/> TPV (Aptivus [®]) | <input type="checkbox"/> BIC (Best. Biktarvy [®]) |
| <input type="checkbox"/> sonstige: _____ | | <input type="checkbox"/> DRV (Prezista [®]) | |
| | | <input type="checkbox"/> RTV (Norvir [®]) | |
| | | <input type="checkbox"/> rtv (Norvir [®] , "Booster") | |

Bestimmung/Vorhersage des Korezeptortropismus (10 ml EDTA-Blut):

- Ausschluss von CXCR4-tropen Viren im Vorfeld eines MVC (Celsentri[®]) Einsatzes

Die Untersuchungsanforderung setzt zur Einstellung der Sequenzierreaktion eine parallele HIV-Viruslastbestimmung voraus.

Entnahmedatum/Uhrzeit: _____ **Unterschrift:** _____