

Serologische Untersuchungen

| Untersuchung | Menge/Material | Präanalytik/Hinweise | Häufigkeit Testdauer | Methode |
|---|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Bordetella pertussis Toxin-AK (IgA) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| Bordetella pertussis Toxin-AK (IgG) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| Chlamydia pneumoniae-AK (IgA) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| Chlamydia pneumoniae-AK (IgG) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| Chlamydia pneumoniae-AK (IgM) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| CMV-AK (IgG) | 0,5 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | CMIA |
| CMV-AK (IgM) | 0,5 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | CMIA |
| Hepatitis A-Virus-Ak (IgG) | 0,5 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | CMIA |
| Hepatitis Bc-Ak (HBc-Ak) | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | CMIA |
| Hepatitis Be-Ak (HBe-Ak) | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | CMIA |
| Hepatitis Bs-Ag (HBs-Ag) | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | CMIA |
| Hepatitis Bs-Ak (HBs-Ak) | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | CMIA |
| Hepatitis C-Virus-Ak (HCV-Ak) | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | CMIA |
| Heterophile IM Antikörper ⁺ | 1 ml Serum | | 2-3 Std. | Lateral flow Immunoassay |
| HIV-1/2-Ak / p24-Ag (HIV-Suchtest, 4. Generation-IA) | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | CMIA |
| HSV-1 AK (IgG) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| HSV-1 AK (IgM) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| HSV-2 AK (IgG) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| HSV-2 AK (IgM) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| HTLV-1/2-Ak | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | CMIA |
| Masern Virus-AK (IgG) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| Masern Virus-AK (IgM) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |

Die mit "+" gekennzeichneten
Parameter sind nicht akkreditierte
Untersuchungen.

Serologische Untersuchungen

| Untersuchung | Menge/Material | Präanalytik/Hinweise | Häufigkeit Testdauer | Methode |
|---|----------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| Mononukleose-Schnelltest | | s. Heterophile IM Antikörper | | |
| Mumps Virus-AK (IgG) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| Mumps Virus-AK (IgM) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| Mycoplasma pneumoniae-AK (IgA) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| Mycoplasma pneumoniae-AK (IgG) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| Mycoplasma pneumoniae-AK (IgM) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| Parvovirus B19-AK (IgG) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| Parvovirus B19-AK (IgM) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | ELISA |
| Rötelnvirus-Ak (IgG) | 0,5 ml Serum | | Mi. | CMIA |
| Syphilis-Ak | | s. Treponema pallidum- Ak | | |
| Treponema pallidum-Ak (IgG, IgM) ⁺ | 1 ml Serum | | tägl. Mo.-Fr. | CMIA |
| Treponema pallidum-Ak ⁺ | 1 ml Serum | | Fr. | passiver Partikel- Agglutinationstest |