

| Erkrankung | Untersuchung | Menge/Material | Häufigkeit Testdauer | Methode |
|---|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| Abacavir Hypersensitivität | HLA-B*57 / B*57:01 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Aderhautmelanom, metastasierend | HLA-A*02:01 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| AGS | HLA-B*47 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| AGS (late-onset-Form) | HLA-B*14 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Akute anteriore Uveitis | HLA-B*27 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Allopurinol-ind. Stevens-Johnson-S. | HLA-B*58:01 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Birdshot-Chorioretinopathie | HLA-A*29 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Carbamazepin-ind. Stevens-Johnson-S. | HLA-B*15:02 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Dermatitis herpetiformis | HLA-B*08, -DRB1*03, 07 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Diabetes mellitus Typ I (insulinabhängig) | DQB1*02, 03, 06 (high resolution) | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Felty-Syndrom | HLA-DRB1*04 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Idiopath. Glomerulonephritis | HLA-DRB1*03 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Juvenile chronische Arthritis | HLA-DRB1*08 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| M. Bechterew | HLA-B*27 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| M. Behcet | HLA-B*51 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| M. Reiter | HLA-B*27 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Narkolepsie | HLA-DQB1*06:02 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Neonatale alloimmun. Thrombopenie | HLA-DRB1*03, -DRB3*, -DQB1*02 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Postinfektiöse (reaktive) Arthritis | HLA-B*27 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Psoriasis arthropatica | HLA-B*27 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Rheumatoide Arthritis | HLA-DRB1*01, 04, 10 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Sjögren-Syndrom | HLA-DRB1*03 | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |
| Zöliakie | HLA-DQA1*, -DQB1* (high resolution) | 3 ml EDTA-Blut | 1-2x / Woche 5-6 Tage | NGS |

Hinweis:

Gemäß Gendiagnostikgesetz muss jeder Untersuchungsanforderung zur Bestimmung krankheitsassoziiertes HLA-Merkmale eine Einwilligungserklärung des Patienten bzw. seines gesetzlichen Vertreters beigefügt sein.

Formulare hierfür sowie Anforderungsformulare für Untersuchungen stehen im Downloadbereich unserer Homepage zur Verfügung.