

Einsender:

Patientendaten:

Untersuchungsanforderung Genotypische Resistenzbestimmung – HBV *

Material: 3 ml EDTA-Blut (HBV-DNA $\geq 10^3 - 10^4$ cop/ml)

Zus. Daten:

HBVeAg: pos ☐ neg ☐ HBV-DNA: _____

Klinische Einstufung:

- | | |
|---|--|
| ☐ therapienaiv (Nukleo(s/t)id-Analoga, auch HIV) | ☐ compliant |
| ☐ therapienaiv (Interferon) | ☐ non-compliant |
| ☐ Therapieversager (Nukleo(s/t)id-Analoga) | ☐ HIV+ |
| ☐ Therapieversager (Interferon) | ☐ HCV+ |

Therapiehistorie, kumulativ (alle antiviralen Medikamente bisher):

- | HBV-Therapie enthält: | HIV-Therapie enthält: | HCV-Therapie enthält: |
|---|------------------------------|---|
| ☐ LAM (Zeffix®) | ☐ 3TC | ☐ Ribavirin |
| ☐ ADV (Hepsera®) | ☐ FTC | ☐ PEG-Interferon |
| ☐ ETV (Baraclude®) | ☐ TDF | |
| ☐ TDF (Tenofovir) | | |
| ☐ LdT (Sebivo®) | | |
| ☐ L-FMAU (Clevudine) | | |
| ☐ Interferon-2 | | |
| ☐ sonstiges: _____ | | |

Letzte Therapie vor Genotypisierung

- | HBV-Therapie enthält: | HIV-Therapie enthält: | HCV-Therapie enthält: |
|---|------------------------------|---|
| ☐ LAM (Zeffix®) | ☐ 3TC | ☐ Ribavirin |
| ☐ ADV (Hepsera®) | ☐ FTC | ☐ PEG-Interferon |
| ☐ ETV (Baraclude®) | ☐ TDF | |
| ☐ TDF (Tenofovir) | | |
| ☐ LdT (Sebivo®) | | |
| ☐ L-FMAU (Clevudine) | | |
| ☐ Interferon-2 | | |
| ☐ sonstiges: _____ | | |

***Die Untersuchungsanforderung setzt zur Einstellung der Sequenzierreaktion eine parallele quantitative HBV-DNA-Bestimmung voraus.**

Bitte beachten Sie das Dokument „Informationen für Einsender“ unter <https://immungenetik-kl.de/downloads/>

Entnahmedatum/Uhrzeit: _____ **Unterschrift:** _____