INSTITUT FÜR IMMUNOLOGIE UND GENETIK

Institut für Immunologie und Genetik GbR | Pfaffplatz 10 | 67655 Kaiserslautern

BAG Dres. Thiele / Kahlert / Heinemann
LABORATORIUMSMEDIZIN
Dr. med. Bernhard Thiele | Dr. med. Mitja Heinemann
Prof. Dr. med. Jens Verheyen | Dr. med. Katharina Brodner
HUMANGENETIK
Prof. Dr. med. Wolfram Henn | Dr. med. Anne-Karin Kahlert
Tel: 0631/31670-0 | Fax: 0631/31670-20
office@immungenetik-kl.de | www.immungenetik-kl.de

Einsender:	**Patientendaten:**

Untersuchungsanforderung Genotypische Resistenzbestimmung – HBV *

Material: **3 ml EDTA-Blut (HBV-DNA ≥ 10^3 – 10^4 cop/ml)**

Zus. Daten:

HBVeAg: pos ❒ neg ❒ HBV-DNA: _____

Klinische Einstufung:

❒ therapienaiv (Nukleo(s/t)id-Analoga, auch HIV)	❒ compliant
❒ therapienaiv (Interferon)	❒ non-compliant
❒ Therapieversager (Nukleo(s/t)id-Analoga)	❒ HIV+
❒ Therapieversager (Interferon)	❒ HCV+

Therapiehistorie, kumulativ (alle antiviralen Medikamente bisher)**:**

HBV-Therapie enthielt:	**HIV-Therapie enthielt:**	**HCV-Therapie enthielt:**
❒ LAM (Zeffix®)	❒ 3TC	❒ Ribavirin
❒ ADV (Hepsera®)	❒ FTC	❒ PEG-Interferon
❒ ETV (Baraclude®)	❒ TDF	
❒ TDF (Tenofovir)		
❒ LdT (Sebivo®)		
❒ L-FMAU (Clevudine)		
❒ Interferon-2		
❒ sonstiges:_____		

Letzte Theapie vor Genotypisierung

HBV-Therapie enthält:	**HIV-Therapie enthält:**	**HCV-Therapie enthält:**
❒ LAM (Zeffix®)	❒ 3TC	❒ Ribavirin
❒ ADV (Hepsera®)	❒ FTC	❒ PEG-Interferon
❒ ETV (Baraclude®)	❒ TDF	
❒ TDF (Tenofovir)		
❒ LdT (Sebivo®)		
❒ L-FMAU (Clevudine)		
❒ Interferon-2		
❒ sonstiges:_____		

Die Untersuchungsanforderung setzt zur Einstellung der Sequenzierreaktion eine parallele quantitative HBV-DNA-Bestimmung voraus.

Bitte beachten Sie das Dokument „Informationen für Einsender“ unter https://immungenetik-kl.de/downloads/

Entnahmedatum/Uhrzeit: _____ **Unterschrift:** _____